

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-46120

⑬ Int. Cl.³

A 61 K 31/395

識別記号

ABC
ABE
ABL

庁内整理番号

7475-4C

⑭ 公開 平成4年(1992)2月17日

C 12 P 17/18
// C 07 D 227/12

8931-4B
6701-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 血管新生抑制剤

⑯ 特 願 平2-152099

⑰ 出 願 平2(1990)6月11日

⑱ 発 明 者 佐 野 浩 東京都町田市玉川学園7-19-16

⑲ 発 明 者 玉 沖 達 也 東京都町田市本町田2662-13

⑳ 発 明 者 大 村 智 東京都世田谷区瀬田5-12-7

㉑ 出 願 人 協和醗酵工業株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6番1号


明 細 書

1. 発明の名称

血管新生抑制剤

2. 特許請求の範囲

一般式(1)



(式中、R¹およびR²は「 δ 」または「 ϵ 」になって結合を表わし、R³およびR⁴が「 δ 」の場合、R¹とR⁴およびR²とR³はそれぞれ一緒になって結合を表わし、R¹およびR²は「 δ 」を表わす。R³およびR⁴が「 ϵ 」になって結合を表わす場合、R²はOCH₃または「 δ 」を表わし、R³はHまたはNH-を表わし、R⁴はHまたはBrを表わし、R⁵、R⁶およびR⁷は、R⁸がOCONH₂の

場合R⁵およびR⁶は一緒になって-O-または結合を表わし、R⁵およびR⁶が「 δ 」になって-O-CO-O-を表わす場合、R⁵はBrを表わす。)で表わされるハービマイシン誘導体を有効成分とする血管新生抑制剤。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、血管新生抑制剤に関する。血管新生抑制剤は、血管の異常増殖によって発症する疾患、たとえばリウマチ性関節炎、糖尿病性網膜症、未熟児網膜症、老人性黄斑変性症、創傷治癒時の過剰瘢痕形成の予防または治療薬として期待される。

従来の技術

血管新生抑制作用を有する物質としては、たとえばノドロキシprogesteron、硫酸化多糖体、牛軟骨抽出液などが知られており、またコルチゾンとヘパリンの併用によって、血管新生を抑制することができることも知られている。

ハービマイシンはアンタマイシン系抗生物質に分類される抗生物質で除菌活性、抗タバコモザイクウイルス活性およびP388ロイケミア、B16

メラノーフ、L1210 ロイケミア、ルイス・ラング・カルシノーマ、エーリッヒ・アサイチス・カルシノーマなどを用いたマウス実験動物系において抗腫瘍活性を示すことが知られている。ある種のハービマイシンの誘導体がエーリッヒ・アサイチス・カルシノーマを用いたマウス実験動物系において抗腫瘍活性を有することが知られている〔ジャーナル・オブ・アンタイバイオティクス (J. Antibiotics) 37, 1264 (1984) ; 39, 415 (1986)〕。

また、ハービマイシン A およびその誘導体が癌化した細胞を正常の細胞に分化させることが知られている〔モレキュラー・アンド・セルラー・バイオロジー (Mol. Cell. Biol.), 6, 2198 (1986), ジャーナル・オブ・アンタイバイオティクス (J. Antibiotics), 41, 831 (1988)〕。


発明が解決しようとする課題

本発明の目的は医薬品として有用な新しい血管新生抑制剤を提供することにある。

を提供する。

以下に、化合物 (1) の具体例およびそれぞれの物理化学的性質を示す。

(1) 化合物 1-1



TLC R_f値: 0.5 (ベンゼン: 酢酸エチル=1:1)

融点: 138℃

旋光度: $[\alpha]_D^{25} = +126.0^\circ$ (c 0.5, CHCl₃)

紫外線吸収スペクトル: $\lambda_{max}^{CH_3OH}$ nm (ε) 272 (23,900)


マススペクトル: m/z 530 (M⁺, C₃₀H₄₂N₂O₅)

水素核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃, 中): δ (ppm)

6.92 (1H, dd, J=1.0, 11.5 Hz), 6.59 (1H, dd, J=2.0, 2.0 Hz), 6.46 (1H, dd, J=11.5, 11.5 Hz), 5.80 (1H, dd, J=11.5, 11.5 Hz), 4.56 (1H, d, J=

課題を解決するための手段

本発明によれば、一般式 (1)




(式中、R¹およびR²はC₂または一輪になって結合を成し、R¹およびR²がC₂の場合、R³とR⁴およびR⁵とR⁶はそれぞれ一輪になって結合を成し、R¹およびR²はHを成す。R¹およびR²が一輪になって結合を成す場合、R³はOCH₃またはC₂を成し、R⁴はHまたはNHを成し、R⁵はHまたはBrを成し、R⁶, R⁵およびR⁷は、R⁶がOCONH₂の場合R⁵およびR⁷は一輪になって-n-または結合を成し、R⁶およびR⁷が一輪になって-O-CO-O-を成す場合、R⁶はBrを成す。)で表されるハービマイシン誘導体を有効成分とする血管新生抑制剤

1) 5Hz), 4.17 (1H, s), 2.95 (1H, d, J=9.0 Hz),

1.33 (3H, t)

(2) 化合物 1-2



TLC R_f値: 0.60 (ベンゼン: 酢酸エチル=1:1)

旋光度: $[\alpha]_D^{25} = -132.0^\circ$ (c 0.2, CHCl₃)

紫外線吸収スペクトル: $\lambda_{max}^{CH_3OH}$ nm (ε) 245 (32,000)


マススペクトル: m/z 629 (M⁺, C₃₀H₄₁N₂O₅)

水素核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃, 中): δ (ppm)

7.60 (1H, brd), 6.42 (1H, s), 4.48 (1H, brs)

特開平 4-46120 (3)

(3) 化合物 I - 3



TLC Rf値: 0.69 (ベンゼン: アセトン=7:3)

融点: 128℃ (分解)

旋光度: $[\alpha]_D^{25} = +54^\circ$ (c 0.5, CHCl₃)

紫外線吸収スペクトル: $\lambda_{max}^{CH_3OH}$ nm(ε) 232(18,500)

高分解能マススペクトル: m/z 578.239

(C₂₇H₃₂O₆Cl₂N₂O₂としての計算値 578.239)

水素核磁気共鳴スペクトル(CDCl₃中):

δ(ppm) 7.23(1H, d, J=2.3Hz), 6.60(1H, dd, J=2.3, 3.0Hz), 5.99(1H, dd, J=7.61, 1.6Hz), 5.80(1H, d, s), 5.51(1H, qd, J=1.0, 7.1Hz), 5.10(1H, brd, J=7.6Hz), 4.50(1H, d, J=3.0Hz), 1.66(3H, d, J=1.1Hz)


J=2.7, 10.6Hz), 4.66(1H, dd, J=2.7, 9.8Hz), 1.75(3H, d, J=1.3Hz)

元素分析: C 60.26, H 6.98, N 2.45, Cl 12.89

C₂₇H₃₂O₆Cl₂N₂O₂としての計算値:

C 60.74, H 6.74, N 2.53, Cl 12.64

(5) 化合物 I - 5



TLC Rf値: 0.45 (ベンゼン: アセトン=7:3)

融点: 178℃ (分解)

旋光度: $[\alpha]_D^{25} = +93^\circ$ (c 0.5, CHCl₃)

紫外線吸収スペクトル: $\lambda_{max}^{CH_3OH}$ nm(ε) 258(18,600)

水素核磁気共鳴スペクトル(CDCl₃中):


δ(ppm) 6.92(1H, d, J=0.9Hz), 6.42(1H, qd, J=1.1, 11.5Hz), 6.32(1H, dd, J=11.5,

元素分析: C 60.01, H 6.92, N 4.71, Cl 5.89

C₂₇H₃₂O₆Cl₂N₂O₂としての計算値:

C 60.18, H 6.80, N 4.84, Cl 6.05

(4) 化合物 I - 4



TLC Rf値: 0.89 (ベンゼン: アセトン=7:3)

融点: 199℃ (分解)

旋光度: $[\alpha]_D^{25} = +99^\circ$ (c 0.5, CHCl₃)

紫外線吸収スペクトル: $\lambda_{max}^{CH_3OH}$ nm(ε) 271(23,500)

高分解能マススペクトル: m/z 553.200

(C₂₆H₃₁O₆Cl₂N₂O₂としての計算値 553.200)

水素核磁気共鳴スペクトル(CDCl₃中):

δ(ppm) 7.33(1H, d, J=2.5Hz), 6.63(1H, dd, J=2.6, 2.5Hz), 6.55(1H, d, J=13.5Hz), 5.86(1H, dd, J=9.8, 13.5Hz), 4.99(1H, dd,

12.5Hz), 5.30(1H, dd, J=10.6, 11.5Hz),

5.28(1H, qd, J=1.0, 7.8Hz), 5.03(1H, d,

J=9.4Hz), 4.49(1H, dd, J=6.9Hz), 4.00

(1H, dd, J=9.1, 10.6Hz), 3.18(1H, dd,

J=1.8, 10.0Hz), 2.26(1H, m), 1.26(3H, d,


J=1.0Hz)

元素分析: C 54.89, H 6.32, N 4.26, Br 12.68

C₂₆H₃₁BrN₂O₆としての計算値:

C 55.20, H 6.34, N 4.29, Br 12.10

(6) 化合物 I - 6



TLC Rf値: 0.84 (ベンゼン: アセトン=7:3)

融点: 132℃ (分解)

旋光度: $[\alpha]_D^{25} = -83^\circ$ (c 0.5, CHCl₃)

紫外線吸収係数 $\lambda_{max}^{(H_2O)}$ nm (ε) 263 (12,000)

水素核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃ 中):

δ (ppm) 7.28 (1H, qd, J=1.2, 12.2Hz), 6.81 (1H, d, J=1.5Hz), 4.81 (1H, d, J=7.3Hz), 4.47 (1H, s), 4.32 (1H, d, J=9.4Hz), 2.32 (1H, m), 1.83 (3H, s)

元素分析: C 48.97, H 5.31, N 1.93, Br 23.59

C₁₀H₁₂BrNO₂ としての計算値:

C 49.24, H 5.38, N 1.92, Br 23.16

化合物 1-1 および 1-2 は特開昭 63-218620

号公報に、化合物 1-3 および 1-6 はジャーナル・オブ・アンチバイオティクス (J Antibiotics), 39, 415 (1986) にそれぞれ製造法とともに記載されている公知物質である。

化合物 (1) は投与の目的および方法により、常法により調製された錠剤、顆粒剤、粉剤、カプセル剤、シロップ剤、軟膏剤、クリーム剤、注射剤などの形で投与することができる。とくに注射剤の形で用いるのが好ましい。注射剤として用いる場合、生理食塩水、ブドウ糖、ラクトース、マ

ンニット注射液に適当な界面活性剤たとえばTween® 80を助剤として加えその化合物 (1) を懸濁させ、これを 1~1000mg/kg、1日1~3回で静脈内あるいは局所に投与する。

化合物 (1) は血管新生作用を有し、ハービマインシンAと比較して低毒性である。また化合物の一部はハービマインシンAが示すような既存の血管に対する作用がないことから、血管の異常増殖によって発症する種々の疾患たとえば、リュウマチ性関節炎、糖尿病性網膜症、末梢神経障害、老人性黄斑部変性、創傷治癒時の過剰瘢痕形成などに有用である。次に化合物 (1) の毒性および薬理作用について、試験例で説明する。

試験例 1

急性毒性試験

6週齢、雄のDDYマウス (25±1g、1群3匹) に、2%のアラビアガムを含む生理食塩水に懸濁した試験化合物を腹腔内に投与し、24時間後の生存率から50%生存投与量 (LD₅₀) を上げ下げ法で算出した結果、化合物 (1) はいず

れもLD₅₀: > 2000mg/kgであった。

試験例 2

鶏受精卵の鶏尿膜内の血管新生に対する抑制作用

エヌ・タナカらの方法 [Experimental Pathology, 30, 141 (1986)] に従い、鶏受精卵の鶏尿膜内の血管新生に対する化合物 (1) の作用を調べた。

10~20歳の4.5日齢の鶏の受精卵に小穴を開け、後尿膜上に酢酸ビニル-エチレン共重合体 (EVA; 三井・デュポン社製) に封入した試験化合物を移植し、37℃で2日間野卵器内で培養後、10%のブタ油乳剤 (イントラリポス (intralipos); ミドリイ辛社製) 10μlを鶏尿膜内に注入し、鶏尿膜内に新生される血管に対する試験化合物の抑制作用の程度を観察した。

すなわち、血管形成の認められない領域が3mm以上の卵卵を完全抑制を示した鶏卵とし、抑制率を次式で算出した。

$$\text{抑制率 (\%)} = \frac{\text{完全抑制を示した鶏卵の数 (個)}}{\text{全鶏卵数 (個)}} \times 100$$

またフィッシャー (Fischer) の正確確立法によりp値を求めた。いずれのデータもp値は0.05以下であった。

その結果を第1表に示す。第1表に示したように、本発明の化合物は、0.01~10mg/個の投与で、有意な血管新生抑制作用が認められた。

試験例 3

既存の血管に対する作用試験

10日目の鶏卵を用いて試験例2と同様にして試験化合物を設置、培養し、鶏尿膜内にすでに形成されている血管に対する作用を調べた。既存の血管の増失が観察されるものを、変化がないものをとして第2表に示す。

第 1 表

化合物	投与量 (mg/個)	抑制率 (%)	既存血管に 対する作用
I-1	0.1	12	+
	1	100	
	10	100	
I-2	0.01	20	+
	0.1	50	
	1	80	
	10	100	
I-3	0.1	12	+
	1	50	
	10	100	
I-4	0.1	12	+
	1	65	
	10	100	
I-5	0.01	10	-
	0.1	30	
	1	35	
	10	30	
I-6	0.01	10	-
	0.1	30	
	1	30	
	10	30	
ハービマイ シンA	0.01	0	+
	0.1	50	
	1	100	

以下に本発明を実施例で示す。

実施例 注射剤

化合物(I-1)の200gをエタノール20Lに溶解した後、ミリポアフィルター(孔径0.22μ)で加圧ろ過して無菌化をこなす。得られる無菌ろ液5.0mlを褐色バイアルに分注し、常法により凍結乾燥し、50mg/バイアルの凍結乾燥剤を得る。

発明の効果

本発明により、医薬品として有用な新しい血管新生抑制剤が提供される。

特許出願人(102) 協和薬機工業株式会社

代表者 加藤 修 夫

